

GRIPEOL GOTAS

CIFARMA Científica Farmacêutica Ltda.

paracetamol 100 mg

maleato de clorfeniramina 2 mg

cloridrato de fenilefrina 2 mg

APRESENTAÇÃO

Embalagem contendo um frasco goteador de 20 mL.

USO ORAL

USO PEDIÁTRICO ATÉ 6 ANOS

COMPOSIÇÃO

Cada mL de **GRIPEOL** gotas contém:

paracetamol	100 mg
maleato de clorfeniramina	2 mg
cloridrato de fenilefrina	2 mg
Excipientes q.s.p.	1 mL

(ácido cítrico, ciclamato de sódio, sacarina sódica, benzoato de sódio, metabissulfito de sódio, macrogol, corante amarelo de tartrazina, aroma de laranja e água purificada).

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

GRIPEOL é um antigripal múltiplo, que contém substâncias que agem contra os sintomas de gripes e resfriados. **GRIPEOL** alivia a obstrução nasal, coriza, febre, cefaleia e dores musculares presentes nos estados gripais.

Cuidados de conservação: Conservar em temperatura ambiente (15°C e 30°C) e proteger da luz e umidade. **GRIPEOL** é válido por 24 meses, a partir da data de fabricação indicada na embalagem. **Não use o medicamento com o prazo de validade vencido.**

Antes de usar observe o aspecto do medicamento. GRIPEOL não deve ser usado durante a gravidez e lactação. Informe ao seu médico a ocorrência de gravidez na vigência do tratamento ou após o seu término. Informe também se estiver amamentando. Caso surjam reações desagradáveis como tontura, vertigem, taquicardia, palpitações, hipertensão, desconforto gástrico e reações alérgicas cutâneas durante o tratamento com **GRIPEOL**, aconselha-se suspender o uso do medicamento e comunicar ao médico. **Informe ao médico ou cirurgião-dentista o aparecimento de reações indesejáveis. ESTE MEDICAMENTO INDUZ SONOLÊNCIA NÃO DEVENDO SER UTILIZADO POR CONDUTORES DE VEÍCULOS, OPERADORES DE MÁQUINAS OU POR AQUELES QUE SEJAM RESPONSÁVEIS PELA A SEGURANÇA DE OUTRAS PESSOAS.** Não use outro produto que contenha paracetamol. O produto não deve ser administrado concomitantemente com inibidores da monoamino-oxidase (MAO), com barbitúricos ou álcool. **Informe ao seu médico sobre qualquer medicamento que esteja usando, antes do início ou durante o tratamento. ATENÇÃO: GRIPEOL gotas contém o corante amarelo de TARTRAZINA, que pode causar reações de natureza alérgica, entre as quais asma brônquica, especialmente em pessoas alérgicas ao ácido acetilsalicílico.** Em pacientes idosos é recomendado o uso sob orientação médica. **Siga corretamente o modo de usar. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação médica. Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.**

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

As ações farmacológicas das substâncias que formam o medicamento **GRIPEOL**, prestam uma cobertura sintomática ampla no tratamento de gripes e resfriados, cuja ação farmacodinâmica e segurança são perfeitamente conhecidas e bem estabelecidas. O paracetamol possui atividade analgésica e antitérmica. Ambas ocorrem devido à inibição da síntese de prostaglandinas no Sistema Nervoso Central. A ação analgésica ocorre, predominantemente, no Sistema Nervoso Central e, a nível menor, através de ação periférica, bloqueando a geração de impulsos dolorosos. A ação antitérmica ocorre no centro cerebral regulador da temperatura. O maleato de clorfeniramina é um agente anti-histamínico. Tem ação contrária a da histamina, que ocasiona a maioria dos efeitos alérgicos presentes nos estados gripais. Atua na musculatura lisa do aparelho respiratório diminuindo os broncoespasmos. Diminui a permeabilidade dos pequenos vasos sanguíneos e conseqüentemente os edemas, rubores e pruridos. Tem ação sobre as glândulas exócrinas, diminuindo as secreções salivares e lacrimais. O cloridrato de fenilefrina atua sobre receptores específicos, causando uma vasoconstrição direta, promovendo o descongestionamento nasal e diminuindo a coriza e a rinite.

INDICAÇÕES

Antigripal múltiplo com ação nas gripes, resfriados, congestão nasal, coriza, febre, cefaleia, dores musculares e demais sintomas presentes nos estados gripais.

CONTRAINDICAÇÕES

O uso de **GRIPEOL** é contraindicado a pacientes com conhecida hipersensibilidade aos componentes da fórmula. Não deve ser administrado à pacientes com hipertensão, doença cardíaca, diabetes, glaucoma, hipertrofia da próstata, doença renal crônica, insuficiência hepática grave, disfunção tireoidiana, gravidez e lactação sem controle médico.

REAÇÕES ADVERSAS

Durante o tratamento, embora raramente, podem surgir reações adversas características, tais como: sedação, sonolência, vertigem, hipotensão, sudorese, palpitações, ansiedade, tremor, insônia, desconforto gástrico, irritações cutâneas. O uso prolongado pode provocar discrasias sanguíneas e necrose papilar renal.

ADVERTÊNCIA

GRIFEOL gotas contém o corante amarelo de TARTRAZINA, que pode causar reações de natureza alérgica, entre as quais asma brônquica, especialmente em pessoas alérgicas ao ácido acetilsalicílico.

PRECAUÇÕES

ESTE MEDICAMENTO INDUZ SONOLÊNCIA NÃO DEVENDO SER UTILIZADO POR CONDUTORES DE VEÍCULOS, OPERADORES DE MÁQUINAS OU POR AQUELES QUE SEJAM RESPONSÁVEIS PELA A SEGURANÇA DE OUTRAS PESSOAS. Não use outro produto que contenha paracetamol.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

O produto não deve ser administrado concomitantemente com inibidores da MAO (monoamino- oxidase), com barbitúricos ou álcool.

Alterações em exames laboratoriais: Os testes de função pancreática utilizando a bentiromida ficam invalidados, a menos que o uso do medicamento seja descontinuado (3) três dias antes da realização do exame. Pode produzir falsos valores aumentados quando da determinação do ácido 5 hidroxilindolacético, quando for utilizado o reagente nitrosonaftol.

POSOLOGIA

Administração por via oral.

Crianças de 4 a 6 anos: 30 a 40 gotas, 3 a 4 vezes ao dia.

Crianças de 2 a 4 anos: 20 a 30 gotas, 3 a 4 vezes ao dia.

Crianças abaixo de 2 anos: Sob orientação médica.

Não administre medicamentos diretamente na boca das crianças, utilize uma colher para pingar as gotinhas.



SUPERDOSE

Promover esvaziamento gástrico através da indução de emese ou lavagem gástrica. A N-acetilcisteína, administrada por via oral, é um antídoto específico para toxicidade induzida pelo paracetamol, devendo ser instituída nas primeiras 24 horas. Medidas de manutenção do estado geral devem ser observadas, como hidratação, balanço hídrico, eletrolítico e correção de hipoglicemia.

PACIENTES IDOSOS

É recomendado o uso sob orientação médica.

SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR. NÃO DESAPARECENDO OS SINTOMAS, PROCURE ORIENTAÇÃO MÉDICA. NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE: VIDE CARTUCHO.

Reg. MS: 1.1560.0061

Farm. Resp.: Dra. Michele Caldeira Landim

CRF/GO: 5122

CIFARMA - Científica Farmacêutica Ltda.

CNPJ: 17.562.075/0001-69

Rod. BR 153 Km 5,5

Jardim Guanabara

CEP: 74675-090 - Goiânia / GO

Indústria Brasileira

