

GASTROLIV®

hidróxido de alumínio - DCB: 04694

hidróxido de magnésio - DCB: 04697

carbonato de cálcio - DCB: 01748

I - IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO

Nome comercial: GASTROLIV®

Nome genérico: hidróxido de alumínio (DCB 04694) + hidróxido de magnésio (DCB 04697) + carbonato de cálcio (DCB 01748)

APRESENTAÇÕES

Pó efervescente – 35,6mg/g + 37mg/g + 46mg/g – Embalagens contendo 100 ou 50 sachês de 5g nos sabores laranja, limão ou abacaxi.

USO ORAL

USO ADULTO

COMPOSIÇÃO

Cada grama de GASTROLIV® sabor laranja contém:

hidróxido de alumínio 35,6 mg
 hidróxido de magnésio 37 mg
 carbonato de cálcio 46 mg
 Excipientes q.s.p. 1g
 (bicarbonato de sódio, ácido cítrico, aspartamo, corante amarelo crepúsculo, aroma de laranja, povidona, álcool etílico, petrolato líquido e simeticona)

Cada grama de GASTROLIV® sabor limão contém:

hidróxido de alumínio 35,6 mg
 hidróxido de magnésio 37 mg
 carbonato de cálcio 46 mg
 Excipientes q.s.p. 1g
 (bicarbonato de sódio, ácido cítrico, aspartamo, corante amarelo de tartrazina, corante azul indigotina, aroma de limão, povidona, álcool etílico, petrolato líquido e simeticona)

Cada grama de GASTROLIV® sabor abacaxi contém:

hidróxido de alumínio 35,6 mg
 hidróxido de magnésio 37 mg
 carbonato de cálcio 46 mg
 Excipientes q.s.p. 1g
 (bicarbonato de sódio, ácido cítrico, aspartamo, corante amarelo de tartrazina, aroma de abacaxi, povidona, álcool etílico, petrolato líquido e simeticona)

II - INFORMAÇÕES AO PACIENTE

1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

GASTROLIV® é indicado para acidez estomacal, azia, desconforto estomacal, dor de estômago, dispepsia, enjoo, náusea, vômito, epigastralgia, má digestão e queimação.

2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

GASTROLIV® associa em sua fórmula substâncias com propriedade antiácida.

3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Pacientes portadores de hipocloridria, hipercalcemia, insuficiência renal ou fibrilação ventricular não devem fazer uso de GASTROLIV®. GASTROLIV® é contraindicado durante o primeiro trimestre da gravidez.

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.

GASTROLIV® sabores limão e abacaxi contêm o corante amarelo de TARTRAZINA (FD&C n° 5) que pode causar reações de natureza alérgica, entre as quais asma brônquica, especialmente em pessoas alérgicas ao ácido acetilsalicílico.

Atenção fenilcetonúricos: contém fenilalanina.

4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Pessoas com doenças renais não devem fazer uso de GASTROLIV®, pois o hidróxido de magnésio ou qualquer outro sal de magnésio em presença de insuficiência renal, provoca depressão do SNC e outros sintomas de hipermagnesemia. O uso de antiácidos durante a gravidez, principalmente no primeiro trimestre e lactação somente poderá ser feito sob prescrição médica.

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.

GASTROLIV® sabores limão e abacaxi contêm o corante amarelo de TARTRAZINA (FD&C n° 5) que pode causar reações de natureza alérgica, entre as quais asma brônquica, especialmente em pessoas alérgicas ao ácido acetilsalicílico.

Atenção fenilcetonúricos: contém fenilalanina.

Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.

5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

GASTROLIV® deve ser conservado em temperatura ambiente (entre 15 e 30°C), protegido da umidade.

GASTROLIV® possui prazo de validade de 24 meses a partir da data de fabricação, desde que observados os cuidados de conservação.

Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.

Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.

GASTROLIV® abacaxi: granulado branco a levemente amarelado. Odor e sabor de abacaxi.

GASTROLIV® laranja: granulado branco a levemente laranja. Odor e sabor de laranja.

GASTROLIV® limão: granulado branco a levemente verde. Odor e sabor de limão.

Antes de usar, observe o aspecto do medicamento.

Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.

Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.

6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

1 a 2 sachês, dissolvidos em 1/2 (meio) copo d'água, conforme a necessidade. Para pessoas com histórico de gastrites e úlceras: Tomar 1 sachê antes e 1 após a ingestão de alimentos e/ou bebidas alcoólicas causadores de azia e da dor estomacal. Não ultrapassar a dose máxima de 10 sachês ao dia. Não repetir a administração em intervalos menores que 1 hora.

Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas sobre este medicamento, procure orientação do farmacêutico. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação de seu médico ou cirurgião-dentista.

7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico ou cirurgião-dentista.

8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?

Constipação ou diarreia.

Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento.

9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?

Procure imediatamente um médico ou um hospital mais próximo.

Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.

III - DIZERES LEGAIS

SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR, NÃO DESAPARECENDO OS SINTOMAS, PROCURE ORIENTAÇÃO MÉDICA.

Farm. Resp.: Dra. Michele Caldeira Landim
 CRF/GO: 5122 – Reg. MS 1.1560.0111

Fabricado por:

CIFARMA – Científica Farmacêutica Ltda.
 Av. das Indústrias, 3651 – Bicas
 CEP: 33040-130 – Santa Luzia/MG
 CNPJ: 17.562.075/0003-20 - Indústria Brasileira

Registrado por:

CIFARMA – Científica Farmacêutica Ltda.
 Rod. BR 153 Km 5,5 - Jardim Guanabara
 CEP: 74675-090 – Goiânia/GO
 CNPJ: 17.562.075/0001-69 - Indústria Brasileira

Esta bula foi aprovada pela Anvisa em 13/09/13.